

## GUM Reeks 16 - Stellingen avond 4:

- 1) Chlamydia staat ook wel bekend als 'de druiper' en gonorrhoe staat bekend als 'de sluiper' onder de soa's.**

Antwoord: Onjuist, het is namelijk andersom. Chlamydia staat bekend als 'de sluiper', omdat de infectie vaak zonder klachten verloopt. Gonorrhoe staat bekend als 'de druiper', omdat het bij mannen een pusachtige afscheiding uit de penis veroorzaakt.

- 2) Meningokokken kunnen de bloed-hersenbarrière passeren.**

Antwoord: Juist, hierdoor kan de bacterie in de hersenen komen en een hersenvliesontsteking veroorzaken.

- 3) Commensale huidbacteriën zijn nooit schadelijk en leiden dan ook nooit tot ontsteking van de huid.**

Antwoord: Onjuist, commensale huidbacteriën kunnen via een wondje de huid en diepere huidlagen infecteren en leiden tot lokale infecties (bv erysipelas) of systemische complicaties tot gevolg hebben (bv toxisch-shock syndroom of bacteriëmie).

- 4) Een gezonde (niet zwangere) vrouw heeft een blaasontsteking. Zij dient direct antibiotica te krijgen.**

Antwoord: Onjuist- eerst niet-medicamenteus behandelen (veel drinken, pijnstilling)

- 5) Een longontsteking wordt veroorzaakt door een bacterie en niet door een virus.**

Antwoord: Fout, een longontsteking kan veroorzaakt worden door verschillende microben. Dit kunnen zowel bacteriën als virussen zijn.

- 6) Bij een ulcus ventriculi ontstaat een situatie waarin de submucosa dusdanig is beschadigd dat de mucosa bloot komt te liggen.**

Antwoord: Onjuist, de mucosa is juist beschadigd, waardoor de submucosa bloot komt te liggen.

- 7) Het eerste verschijnsel, dat tot 2 maanden na de tekenbeet kan ontstaan, is altijd een (blauw)rode, ronde vlek die groter wordt.**

Antwoord: onjuist, de ziekte van Lyme kan zich uiten in een verkleuring van de huid op de plek van de tekenbeet, die steeds groter wordt. Deze verkleuring kan tot 3 maanden na een tekenbeet verschijnen en kan verschillende verschijningsvormen hebben. Dit is dus niet altijd erythema migrans.

- 8) Bij diarree is dient men antibiotica te krijgen.**

Antwoord: Onjuist, dit hangt af van de oorzaak. Bij een infectieuze oorzaak kan het worden gegeven. Let op, diarree kan juist een bijwerking zijn van antibiotica!