

Stellingen avond 1 – De mond en slokdarm

Het hele gebit bestaat uit 32 tanden, 12 snijtanden, 8 kleine kiezen en 12 grote kiezen	Juist (vermenigvuldig het aantal tanden per kaak met 2)
Amylase is een enzym dat vetten afbreekt	Onjuist (amylase breekt zetmeel en grote suikerketens af)
Voedsel zakt in de slokdarm door een voorbijkomende drukgolf die alle spieren in de slokdarm laat samentrekken	FOUT (De drukgolf die het eten voortstuwt laat de spieren van de slokdarm opeenvolgend (van boven naar beneden) samentrekken om peristaltiek te creëren. Terwijl deze spiervezels samentrekken moeten de spieren van de sluitspier echter ontspannen zodat het eten goed kan zakken. Niet alle spieren trekken dus samen, het is een samenwerking tussen contractie en relaxatie.)
Tijdens de faryngeale fase zorgt de uvula voor het afsluiten van het strottenhoofd.	Fout (de epiglottis zorgt hiervoor. De uvula sluit de neusholten af.)
Een toegenomen druk in de buik t.g.v. overgewicht, obesitas of zwangerschap speelt een rol bij het ontstaan van refluxklachten.	Juist (door een toegenomen druk in de buik staat de sfinctercomplex van de slokdarm op spanning en is er meer kans op reflux.)
Bij een Barrett oesophagus moet er een regelmatig controle door middel van een gastroscopie plaatsvinden voor alle patiënten.	Onjuist
Bij slokdarmkanker is het meest voorkomende symptoom dat voedsel niet goed zakt.	Juist
Een gastroscopie kan worden uitgevoerd indien er een verdenking op een bloeding is.	Juist