

Stellingen avond 4

<p>De dikke darm ligt geheel binnen het buikvlies</p>	<p>Dit is <b>onjuist</b>. De het colon ascendens en descendens samen met de endeldarm liggen buiten het buikvlies.</p>
<p>De bacteriën in het colon hebben een beschermende functie.</p>	<p><b>Juist</b>, de darmflora zorgt door middel van kolonisatie dat ziekmakende bacteriën geen kan krijgen om aan te hechten op de darmwand en zich te vermenigvuldigen.</p>
<p>Bij colitis ulcerosa is het rectum altijd aangedaan.</p>	<p><b>Juist</b>, bij colitis ulcerosa is het rectum altijd aangedaan. Echter, bij de ziekte van Crohn wordt het rectum vaak gespaard.</p>
<p>Skip lesions zijn karakteriserend voor de ziekte van Crohn.</p>	<p><b>Juist</b>, bij Crohn wisselen gezonde en onstoken delen darm elkaar af. Dit worden skip lesions genoemd.</p>
<p>Het prikkelbare darm syndroom kan ontstaan na een maag-darmonsteking of een voedselvergiftiging.</p>	<p><b>Juist</b>. De precieze oorzaak van PDS is niet bekend, maar het blijkt regelmatig te ontstaan na en gastro-enteritis of een voedselvergiftiging. Mogelijk omdat dit de darmwand beschadigd waardoor deze anders gaat functioneren of doordat de darmflora veranderd.</p>
<p>Bloed bij de ontlasting is geen reden om naar de huisarts te gaan</p>	<p><b>ONJUIST</b>: Bloed bij de ontlasting kan meerdere oorzaken hebben, omdat het echter ook veroorzaakt kan worden door darm kanker is het belangrijk om hierbij altijd de huisarts te raadplegen</p>
<p>De eerste keus behandeling voor een blindedarmontsteking is een operatie.</p>	<p><b>Juist</b></p>
<p>Diverticulitis moet altijd met antibiotica worden behandeld</p>	<p><b>Onjuist</b> – meestal kan het lichaam de bacteriën zelf binnen enkele weken opruimen. Dan is een behandeling met alleen pijnmedicatie en medicatie om de ontlasting te verdunnen voldoende. Mocht het lichaam het zelf niet kunnen opruimen, dan kan er een antibioticum worden voorgeschreven die het lichaam helpt om de bacteriën te doden.</p>