

Stellingen Avond 4 - 7 juni 2017

1. De linker nier ligt hoger dan de rechter nier.
Antwoord: Juist. Dit komt doordat de lever aan de rechterkant van de buik de rechter nier minder ruimte geeft.
2. De helicobacter pylori bacterie is altijd aanwezig wanneer er sprake is van een maagzweer.
Antwoord: Onjuist. De helicobacter pylori bacterie is wel in de meeste gevallen aanwezig, maar zeker niet altijd.
3. Als de darm bij verdenking darmischemie geprikkeld is de beste behandeling darmrust, bloedverdunners, pijnstilling en antibiotica.
Antwoord: Onjuist, bij een geprikkelde buik bij darmischemie is er sterke verdenking op een darminfarct of een darmperforatie, er is dan altijd een operatie nodig om het probleem op te lossen.
4. Een appendicitis begint meestal kenmerkend met pijn in de buik rechtsonder die zich verder verspreidt richting de navel.
Antwoord: Onjuist: de pijn begint juist meestal in de navel en verspreidt zich dan verder richting de rechter onderbuik.
5. Kenmerkend is dat de patiënt met acute cholecystitis een scherpe pijn voelt wanneer de arts op de rechter bovenbuik drukt. De pijn kan toenemen bij diep inademen en straalt vaak uit naar de onderkant van het rechter schouderblad.
Antwoord: Juist. De pijn in het rechter schouderblad wordt ook wel referred pain genoemd.
6. Bij een acute pancreatitis wordt het pancreasweefsel als het ware door zijn eigen enzymen 'opgegeten'.
Antwoord: Juist, als zo'n galsteen vast blijft zitten in de afvoerbuis, hopen geactiveerde enzymen zich in de alveesklier op en beginnen ze de cellen van de alveesklier zelf te verteren.
7. Pyelonefritis kan ontstaan wanneer een urineweginfectie niet wordt behandeld.
Antwoord: Juist. Pyelonefritis ontstaat inderdaad meestal vanuit bacteriën die zich in de blaas bevinden en dan 'opstijgen' naar boven. Wanneer deze blaasontsteking dus op tijd en goed wordt behandeld zullen deze bacteriën geen kans meer hebben om hoger op een ontsteking te kunnen veroorzaken.
8. Een buitenbaarmoedelijke zwangerschap kan door verplaatsen van het vruchtje naar de baarmoeder toch nog ontwikkelen tot een normale zwangerschap.
Antwoord: Onjuist. Een buitenbaarmoederlijke zwangerschap kan zich nooit ontwikkelen tot een normale zwangerschap. De eerste weken zijn qua innestelling al zó belangrijk, dat wanneer innestelling op de verkeerde plaats heeft plaatsgevonden, dit niet meer hersteld kan worden.
9. Een divertikel is een uitstulping in het darmlumen.
Antwoord: Onjuist. Een divertikel is een uitstulping van de darm aan de buitenkant van de darm. Een uitstulping in het darmlumen heet een poliep.

10. Als er bloed bij de ontlasting zit spreekt men altijd van een acute buik.

Antwoord: Onjuist. Bijvoorbeeld de ziekte van Crohn, ambeien, of een rectumcarcinoom kunnen ook bloed bij de ontlasting geven.

11. Na een buikoperatie is er een vergrote kans op een littekenbreuk, ook wel hernia cicatricialis genoemd.

Antwoord: Juist. Doordat de buikwand is beschadigd na de operatie, kan er, wanneer er een verhoogde druk op de buikwand ontstaat, een hernia worden gevormd.

12. Organen in de buik kunnen in of achter het buikvlies liggen. De pancreas (alvleesklier) is een van de organen welke in het buikvlies ligt, ook wel intraperitoneaal genoemd.

Antwoord: Onjuist. De pancreas ligt retroperitoneaal.